



Samen Da Vinci

Triage



**KEEP
CALM
AND
TRIAGE**

Programma periode 2



- ▶ Armklachten Bursitis
- ▶ Arm en neklachten
- ▶ Rugpijn en hernia
- ▶ Koorts en griep
- ▶ Koorts en kinderziekten
- ▶ Oorklachten
- ▶ Praktijktoets>

Programma



- ▶ Welkom/ Presentie
- ▶ Uitleg praktijktoets
- ▶ Huiswerk volgende les
- ▶ Presentatie

Toets



- ▶ 1 ingangsklacht van een ziektebeeld
- ▶ Waar wordt op beoordeeld:
 - Vraagstelling
 - Inschatting van het ziektebeeld
 - Planning en afspraken
 - Urgentie
 - Vangnet
- ▶ Je zorgt dat je op de afgesproken tijd klaar zit voor het lokaal
- ▶ Je hebt een pen bij je
- ▶ Overige studenten zijn gewoon aanwezig ivm een lesopdracht! Deze komt te staan op My Da Vinci.

Huiswerk



- ▶ Bestudeer hoofdstuk 19 over nekkklachten!
- ▶ Zoek op thuisarts.nl nekkklachten op.
- ▶ Wat zijn de bijbehorende ziektebeelden?

Leerdoelen



- ▶ Je weet wat de oorzaak kan zijn bij armklachten
- ▶ Je legt de FAST test uit
- ▶ Je kunt uitleggen hoe nekkklachten kunnen ontstaan

Arm en nekklachten




Wat is een bursitis en hoe ontstaat deze?



- ▶ Een slijmbeursontsteking van de elleboog
- ▶ “studentenelleboog”
- ▶ Bij reumatoïde artritis of jicht kunnen ontstekingen in slijmbeurs ontstaan.
- ▶ Soms kunnen bacteriën via een wondje in de huid in de slijmbeurs komen.




Wat zijn de adviezen bij bursitis?

- ▶ Rust.
 - ▶ Als de klachten niet verdwijnen, kan de huisarts de zwelling leegzuigen met een injectiespuit.
 - ▶ Als de elleboogsontsteking lang duurt of steeds terugkomt, kan de huisarts een ontstekingsremmer (corticosteroid) in de slijmbeurs spuiten.
 - ▶ Bij een infectie met bacteriën is snel behandeling nodig. Door de bacteriën vult de slijmbeurs zich met pus (een abces).
 - ▶ De huisarts snijdt dan in de slijmbeurs, zodat de pus eruit kan. Daarna is een drain (slangetje voor de afvoer van pus) en verband nodig. Eventueel antibiotica.
- 

Wanneer neemt de patiënt contact op bij bursitis?

- ▶ Als de slijmbeursontsteking heel vaak terugkomt of ontstaan is na een ongeval door een los stukje bot.
- ▶ Wanneer de patiënt erg ziek is bij een slijmbeursontsteking.



Andere oorzaken voor armklachten

CVA > U1 of U2




Scheve mond?



Verwarde spraak?




Lamme arm?



Hernia U3 en U4

Andere oorzaken voor armklachten

Carpaletunnelsyndroom U3 en U4



- ▶ Spierpijn U5
- ▶ Doorbloedingsstoornis, bijvoorbeeld door trombose U2
- ▶ Panaritium= ontstoken vingertop U3
- ▶ Paronychia= ontstoken nagelriem U4

Opdracht

- Om te checken of een patiënt mogelijk een CVA heeft, word je als assistente geacht de FAST test te kunnen afnemen. Wat is de FAST test
- 1. Zoek uit waar de letters FAST voor staan
- 2. Schrijf dit per letter op
- 3. Oefen met behulp van vragen de FAST test met een medestudent
- 4. 15 minuten de tijd



Learn it. Share it. You could save a life.

Nabespreken FAST test

FAST Test
How To Recognise Signs of Stroke

FACE	Check their face. Has their mouth drooped?	
ARMS	Can they lift both arms?	
SPEECH	Is their speech slurred? Do they understand you?	
TIME	Time is critical. If you see any of these signs, call 000 now.	

peoplepledge
www.peoplepledge.com.au/fun Information by World Stroke Organisation

Vragen





Samen Da Vinci