




da Vinci
college

Samen Da Vinci

Huiswerk:

- Leer voor de praktijktoets
- Herhaal de ziektebeelden van het afgelopen jaar
- Over 2 weken praktijktoetsen..

Zwangerschap & complicaties



Welke complicaties?

- Miskraam
- Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
- Voorliggende moederkoek
- Loslating moederkoek

Miskraam

- Een miskraam is een natuurlijke, maar ingrijpende gebeurtenis in de eerste 3 maanden van de zwangerschap.



En dan..

- Bloedverlies want erger wordt
- Menstruatie-achtige pijn
- Het is fijn als er iemand bij de patiënt is
- Eventueel controle na een week
- Meestal wordt het vruchtje binnen 2 weken na het begin van de bloeding afgestoten.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

- EUG= Extra Uterine Graviditeit
- Bevruchte eicel in de eileider (zelden)
- Veel pijn en bloedverlies
- 5/6^{de} week




Voorliggende moederkoek

- Placente preavia
- Pijnloos en bloedverlies later in de zwangerschap
- Vrouw moet direct gaan liggen!

Loslating moederkoek

- **Solutio Placentae**
- **Kan ontstaan door:**
- Auto-ongeluk of ernstig ongeval
- Vrouwen die meerdere bevallingen hebben doorgemaakt
- Waar het eerder bij is voorgekomen
- Zwanger van een meerling



Extra risicofactoren:



- Hoge bloeddruk
- Diabetes
- Roken, alcohol en drugsmisbruik

Let dus op de volgende symptomen:

- Erge buikpijn
- Bloedverlies (veel en donkerrood bloed)
- **Bij klein gedeelte loslating:**
 - Lichte vaginale bloeding
 - (Plan: vloeistofbehandeling en bedrust)

U1

- **Hoe erg is de buikpijn?**
 - **Hoeveel weken bent u zwanger?**
 - **Is er een echo gemaakt?**
 - **Heeft u bloedverlies, hoeveel?**
 - **Zijn er weeën? Om de hoeveel tijd?**
 - **Persdrang? Is er een verloskundige?**
 - **Is er buikpijn tussen de weeën?**
 - **Zijn er stuipen geweest of nog?**
- **Altijd overleg met de huisarts!**
 - **Erge buikpijn**
 - **Bloedverlies (veel en donkerrood bloed)**
 - **Insult**
 - **Uitdrijving zonder begeleiding**
 - **Insult**
 - **Fors of continu vaginaal bloedverlies**
 - **Vaginaal bloedverlies, langer dan 34 weken zwanger en bekend met voorliggende of laagliggende placenta.**

U2 (Zijn er weeën? Om de hoeveel tijd? Wordt er leven gevoeld?)

- Vermoeden regelmatig weeën bij een zwangerschap minder dan 34 weken
- Geen of duidelijk minder leven voelen en voorheen wel goed

U3 (Is er vaginaal bloedverlies? Verliest u vruchtwater?)

- Vermoeden regelmatige weeën bij een zwangerschap langer dan 34 weken
- Vruchtwaterverlies
- Vaginaal bloedverlies en zwangerschap 17-34 weken

Filmpje

[voortijdige placenta loslating](#)

Vragen



Triagevragen

- Noteer vanuit de triagewijzer de vragen die je stelt bij ingangsklachten rondom zwangerschap
- Oefen zelf de vragen die je stelt bij de vergeten pil
- Tijdens de praktijkles gaan we dit klassikaal doornemen, dus bereid je voor.



Samen Da Vinci