

da Vinci
college

Samen Da Vinci

Buikpijn

Darmen werken
minder goed

Adrenaline stijgt

Minder bewegen

Hartslag gaat
omhoog

Vermoeidheid

Emotionele reactie
/ boosheid /

Programma periode 5

- Trauma/ ABCDE Triage en bloedneus
- Extremiteiten/ Beenklachten, dik, rood been
- Buik/ Braken
- Buik/ Buikpijn kind
- Buik/ Buikpijn volwassenen
- Buik/ obstipatie
- Buik/ Diarree
- Herkansingen: theorie en praktijk leerjaar 1
- Theorietoets



triage theorie

- Welkom & Presentie
- Bespreken van de leerdoelen
- Huiswerk → voor volgende week
- Presentatie
- Opdracht
- Leerdoelen bereikt?

Leerdoelen



- Je kunt omschrijven wat buikpijn inhoudt.
- Je kunt symptomen benoemen bij buikpijn.





Huiswerk

Maak de opdracht op It's

Lezen en samenvatten:

Hoofdstuk 7 en 8


Hoofdstuk 10 en 21

www.thuisarts.nl

- Coeliakie
- Ik wil de oorzaak weten van de buikpijn bij mijn kind
- Bekijk op It's Learning de filmpjes over buikpijn

Buikpijn bij een kind

- **Een buik bevat veel organen!**
- Buikpijn is soms duidelijk aanwijsbaar, maar lang niet altijd!
- Onder buik wordt verstaan: gebied tussen onderkant ribbenkast en de schaamstreek/liezen.



Wat is dan buikpijn?

- Soms ergens anders last, maar voelt het kind dat als buikpijn!



Stress !!

Afspraak!

- Kinderen met buikpijn altijd een afspraak!

Buikpijn na een ongeval

- Altijd zien
- Let op HET: Hoog Energetisch Trauma > met hoeveel kracht of snelheid het lichaam in aanraking is gekomen met iets anders: **SPOED!**



Buikpijn en koorts

- Gastro-enteritis
- Urineweginfectie
- Appendicitis
- Peritonitis



Gastro-enteritis

- Virus
- Misselijkheid en braken
- Diarree


Urineweginfectie

- Bij jonge kinderen onduidelijke verschijnselen
- Bij oudere kinderen:
 - Pijn bij plassen
 - Gevoel van volle blaas > kleine beetjes plassen
 - In de broek plassen
 - Vraag dus altijd urine mee om UWI uit te sluiten!




Appendicitis

- = blindedarmontsteking
- Koorts
- Pijn rond de navel en loslaatpijn
- Misselijkheid en/ of braken
- Pijn rechts in de onderbuik
- **Met spoed naar de huisarts!**
- Risico op buikvliesontsteking.



Peritonitis

- =Buikvliesontsteking
- Hoge koorts, buikpijn en braken!




Hevige pijn en bobbel in de lies

- Aanvallen van heftige buikpijn
- Pijnlijke bobbel
- Liesbreuk = uitstulping van het buikvlies
- Komt voor bij jonge kinderen en volwassenen boven de 40
- Beklemde liesbreuk: een stuk darm in de uitstulping, die afgesnoerd raakt.

Jongens met hevige pijn in de onderbuik



- Jongen met hevige pijn in de onderbuik: torsio testis
- Zaadbal is om zijn as gedraaid
- Bloedvaten en de zaadstreng worden afgekneld
- Pijn in één zaadbal door zuurstofgebrek
- **SPOED!**



Volvulus

- Darm die gedraaid is om de lengteas.
- In eerste levensmaanden
- Aangeboren of andere oorzaken
- Ontroostbaar huilen
- Heftige krampende buikpijn
- Braken
- Geen ontlasting of windjes meer
- Zeldzaam, maar **SPOED!**

Invaginatie

- Een deel van de dunne darm of dikke darm schuift in zichzelf en veroorzaakt darmafsluiting
- Bij zuigelingen
- Acute buikpijn en huilen met braken en wit wegtrekken, in aanvallen
- 24 uur na begin van aanval aardbeiengeleiachtige poep
- Zeldzaam, maar **SPOED!**

Baby's met darmkrampjes

- Vervelend maar onschuldig
- Voorkomen door baby's goed te laten boeren
- Wrijven over het buikje

Opdracht

- Zoek met behulp van de triagewijzer de vragen op
- Noteer deze vragen
- Welke urgenties krijg je bij de betreffende vragen?

Nabespreken opdracht

- Maakt het kind een zieke indruk?
- Heeft het kind koorts?
- Is het kind misselijk?
- Braakt het kind?
- Hoe is de ontlasting?
- Drinkt het kind goed?
- Hoe erg is de buikpijn?

Vragen en advies

- **U2: (Hoe ziek is het kind; Hoe erg is de buikpijn? Wat doet het kind als hij/ zij buikpijn heeft)**
 - Buikpijn door een ongeval
 - Buikpijn en erg zieke indruk
 - Hevige buikpijn en bloedbraken (maagzweer of uitgezette aderen in de slokdarm)

Vragen en advies:

- **U3:(Geeft het kind over, is er koorts; zit er bloed bij de ontlasting; Hoe klinkt het huilen van het kind?)**
 - Buikpijn en ontroostbaar huilen, koorts, voortdurend braken en rectaal bloedverlies
- **U4:(Waar zit de buikpijn? Wanneer heeft het kind buikpijn; is er iets spannends aan de hand?)**
 - Kinderen met buikpijn, waarbij klachten verergeren mogen komen, maar kunnen zonder spoed worden gezien. (altijd urine meenemen?)

Vragen en advies:

- Bij U2 of U3> kind niet laten eten of drinken



**Bedankt voor
jullie aandacht
en
nu niet teveel
vragen stellen aub**



Samen Da Vinci